

ZAŁĄCZNIK NR 7 LEKI DODATKOWE:

Przeciwalergiczne:

- Clemastin (ampułki)
- Loratadine (tabletki)
- Adrenalina (ampułki)
- Dimetindene (np. Fenistil – miejscowo)

Przeciwbólowe i rozkurczowe:

- Paracetamol (tabletki)
- Ketoprofen (np. Ketonal – tabletki i ampułki)
- Drotaverine (np. No-spa – tabletki i ampułki)

Silnie przeciwbólowe:

- Morfina (ampułki)
- Fentanyl (ampułki)

Przeciwwymiotne:

- Metoklopramid (tabletki i ampułki)

Kardiologiczne:

- Kwas acetylosalicylowy (np. Aspiryna – tabletki)
- Gliceryl trinitrate (np. Nitrogliceryna – spray)
- Captopril (tabletki)
- Furosemid (ampułki i tabletki)

Przeciwcukrzycowe:

- Glukoza 20% (ampułki)
- Glukoza 40% (ampułki)
- Glukagon (ampułki)

Przeciwaśmatyczne:

- Salbutamol (aerazol i ampułki do inhalacji)

Stosowane w resuscytacji:

- Epinephrine (Adrenalina – ampułki)
- Atropina (ampułki)
- Amiodaron (ampułki)
- Nalokson (ampułki)

Płyny infuzyjne:

- 0,9% NaCl
- 5% Glukoza
- PWE

Przeciwdrgawkowe:

- Diazepam (ampułki)
- Clonazepam (ampułki)
- Relanium (ampułki i tabletki)